

12 emes Edition EPU SYNACASS-CI

SYNTHESE

Pr Dinard KOUASSI

PLAN DE PRESENTATION

- INTRODUCTION
- GENERALITES
- EXPOSE ANALYTIQUE DES COMMUNICATIONS
- RECOMMANDATIONS
- CONCLUSION

INTRODUCTION

- EPU SYNACASS-CI Organisé malgré la situation sociopolitique
- Marque de la vitalité d'un syndicat fort
- Le thème des urgences est d'actualité

GENERALITES

- CONFERENCES INAUGURALES (4)
- CEREMONIE D'OUVERTURE
- SYMPOSIUM (2)
- SESSIONS(6)
- COMMUNICATIONS (25 sur 30)
- PARTICIPANTS (189)

EXPOSE ANALYTIQUE (1)

- Le Plan ORSEC est mieux connu du personnel de santé en dépit des difficultés de fonctionnement
- Le service des urgences occupe une fonction essentielle dans tout établissement de santé. Constitue une vitrine
- La décision de pratiquer une transfusion sanguine reste un acte médical auquel est toujours lié un risque
- Les dispositifs de gestion d'alerte sanitaire comportant les modes d'organisation et les dispositifs spécifiques de riposte ont été précisés.

EXPOSE ANALYTIQUE (2)

Urgences médicales

- Médicaments essentiels sont prescrits aux urgences (100%). Disponibilité peu satisfaisante . L 'usage rationnel des médicaments en urgence s'avere indispensable
- Les comas non traumatiques sont fréquents chez les diabétiques. Le coma acidocétosique est fréquent, grave et le type hyperosmolaire peu fréquent. Leur amélioration passe par l'éducation du patient et de l'entourage

EXPOSE ANALYTIQUE (3)

- [La crise de goutte](#) est le chef de file des arthropathies microcristallines. Le traitement repose sur l'utilisation correcte de la colchicine des AINS
- [Le prurit](#) est un signe fonctionnel commun à un grand nombre de dermatoses et de maladies non dermatologique. La recherche étiologique est essentielle.

[Le rôle du pharmacien dans la prise en charge des AES](#)
est capital pour la disponibilité des médicaments et des intrants

EXPOSE ANALYTIQUE (4)

- La tuméfaction inflammatoire est le principal motif de consultation des [lithiases salivaires](#)
- [La prise en charge des intoxications alimentaires en zone rurale](#) est dépendante du type de toxique que le clinicien devra retrouver
- [La prise en charge de la douleur thoracique](#) est le fruit d'un examen clinique complet et sa fréquence est sous estimée.

EXPOSE ANALYTIQUE(5)

- Urgence chirurgicales

Les urgences ophtalmologiques nombreuses, variees imposent prise en charge adéquate, pluridisciplinaire

- Fistule digestive externe complication grave en chirurgie abdominale, taux élevé intervention itérative, Pansement aspiratif continu technique simple de prise en charge en milieu sous équipé est rapportée

- Ostéomyélite de l'adulte drépanocytaire est fréquente, double hétérozygote SC. y penser devant douleur osseuse fébrile prolongée

EXPOSE ANALYTIQUE (5)

Urgences Pédiatriques

- La prise en charge de l'agitation psychomotrice de l'enfant et de l'adolescent suggère un entretien surtout famille pour comprendre la crise, dédramatiser la situation. Les médicaments (anxiolytiques, **neuroleptiques sédatifs**) avant Hospitalisation

EXPOSE ANALYTIQUE (6)

- La prise en charge des traumatismes alvéolo dentaires des enfants dans les accidents de la circulation doit être prompte, raisonnée, pallier choc psychologique, évaluer les dégâts. Redonner la perspective d'une bonne santé bucco dentaire

EXPOSE ANALYTIQUE (7)

En Odontologie, la douleur dentaire survient dans les caries dentaires profondes et leurs complications.

La prise en charge impose la consultation du chirurgien dentiste ou a défaut , comme mesure palliative immédiate, la prise d'analgésique.

EXPOSE ANALYTIQUE (8)

Urgences gynéco obstétricales et chirurgicales

- **Les hémorragies génitales sont un motif fréquent de consultation**
- **La maîtrise de la démarche diagnostique permet une prise en charge correcte de la patiente et donc un meilleur pronostic**

EXPOSE ANALYTIQUE (9)

- **Communications libres**
- L'érysipèle reste une affection cutanée fréquente de diagnostic essentiellement clinique et de prise en charge précoce par ATB au long cours
 - Le syndrome de Lyell, grave, urgence vitale, diagnostic précoce (iatrogène) avec thérapeutique lourde
 - La prise en charge de la fonction masticatoire améliore l'hypoprotidémie du sujet âgé

RECOMMANDATIONS

- **MSLS**
- Réhabiliter et rendre autonome les services d'urgence selon des normes nationales
- Créer une coordination des urgences
- Rendre disponible les produits et le matériel pour une prise en charge immédiate des patients

RECOMMANDATIONS

- Organisations professionnelles ordinales de santé
- Organiser les urgences pour toutes les spécialités notamment les urgences odontologique, psychiatrique et vétérinaire
- Responsables des établissements de santé
- Mettre en œuvre les mesures de prévention des risques professionnels particulièrement la vaccination, AES, accident du travail

RECOMMANDATIONS

- Ecoles de formation de base en santé
- Inclure dans les curricula de formation un module pluridisciplinaire se rapportant aux urgences
- Instituer une formation diplômante de secouriste pour tous les professionnels de santé

RECOMMANDATIONS

- **MUGEFCI**
- Renforcer le partenariat existant par l'organisation d'un EPU conjoint SYNACASSCI MUGEFCI
- **AUTRES PARTENAIRES**
- Formaliser le contenu des partenariats
- **SYNACASSCI**
- Instituer un comité scientifique permanent chargé du suivi des recommandations et de l'organisation des EPU

RECOMMANDATIONS

- Réorienter les EPU en impliquant les autres professionnels de santé incluant des journées scientifiques
- Encourager tous les professionnels de santé à communiquer sur leur pratique professionnelle
- Sensibiliser les membres du syndicat à participer massivement aux EPU

RECOMMANDATIONS

- Elaborer des guides de bonne pratique professionnelle en priorité sur les urgences
- Assurer la diffusion scientifique des travaux

CONCLUSION

- L'organisation de EPU de 2011 a été satisfaisante
- Permettra d'améliorer les capacités de prise décisionnelle en matière d'urgence